

SUPERFÍCIE EXTERIOR DA TAMPA E BASE EXTERIOR DA CAIXA

EUPHON^â PASTILHAS
Extracto de erísimo - 10 mg
70 Pastilhas

Lote:

Validade:

Composição

Erísimo (extracto seco aquoso).....10,000 mg
Excipientes (glucose, sacarose, entre outros) q. b. p.....1 pastilha

Indicações terapêuticas

Tratamento sintomático da afonia, rouquidão e tosses irritativas.
Afeções laríngeas.

Classificação Farmaco-terapêutica

Grupo VI - 2 – medicamentos do aparelho respiratório – medicamentos para aplicação tópica na orofaringe.

Contra-indicações

Crianças de idade inferior a 6 anos (risco de engolir as pastilhas).
Devido à presença de sacarose, glucose e açúcar invertido, este medicamento está contra-indicado no caso de intolerância à frutose, de síndrome de má absorção de glucose e galactose ou de deficiência em sucrase-isomaltase.

Posologia usual

Adultos: 10 a 12 pastilhas por dia

Crianças a partir dos 6 anos: 5 a 6 pastilhas por dia

Modo e via de administração e qual o momento mais favorável à administração e duração da administração

Deixar dissolver na boca e engolir, quando necessário, não ultrapassando a posologia máxima diária, durante o tempo suficiente para sentir melhoras, até um máximo de 5 dias.

Registo n.º 8834101 no INFARMED

Medicamento não sujeito a receita médica

Fabricado por: Laboratoires Mayoly Spindler - França

Detentor da A.I.M.:

Jaba Recordati, S.A.
Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo

SUPERFÍCIE INTERIOR DA TAMPA

Efeitos secundários

Devido à presença do vermelho de cochonilha pode haver o risco de reacções alérgicas.

Interacções

Não estão descritas.

Precauções

Se for diabético ter em conta que cada pastilha contém à volta de 0,6 g de açúcar.

No caso de persistência dos sintomas para além de 5 dias e/ou febre associada a situação deverá ser reavaliada.

Efeitos em grávidas, lactentes, crianças e idosos

Não estão descritas malformações nem efeitos tóxicos sobre o feto, no entanto, como medida de precaução, é preferível não utilizar na gravidez. Nos lactentes e crianças até 6 anos está contra-indicado. Nas crianças mais velhas e idosos não estão descritos quaisquer efeitos nefastos.

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas

Nenhuns.

Sobredosagem

Em princípio não se verifica.

Lista de excipientes cujo conhecimento seja eventualmente necessário para a utilização conveniente do medicamento

Contém sacarose, glucose e açúcar invertido.

Conselhos ao utente

Todos os medicamentos para além dos efeitos benéficos, podem apresentar efeitos secundários.

Caso ocorra algum efeito diferente dos mencionados nos “efeitos secundários” deve comunicá-lo ao seu médico ou farmacêutico

Não se esqueça de verificar se o medicamento está dentro do prazo de validade inscrito na embalagem.

Medicamento não sujeito a receita médica.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não guardar acima de 25°C.

Data de revisão do texto

Outubro 2008