

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Lercanidipina Jaba 10 mg Comprimidos revestidos por película
Lercanidipina Jaba 20 mg Comprimidos revestidos por película

Cloridrato de Lercanidipina

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Lercanidipina Jaba e para que é utilizado
2. Antes de tomar Lercanidipina Jaba
3. Como tomar Lercanidipina Jaba
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Lercanidipina Jaba
6. Outras informações

1. O QUE É Lercanidipina Jaba E PARA QUE É UTILIZADO

Lercanidipina Jaba pertence a um grupo de medicamentos designados por bloqueadores da entrada de cálcio (derivados da dihidropiridina). Lercanidipina Jaba é utilizado para o tratamento da tensão arterial elevada, também conhecida como hipertensão, em adultos com mais de 18 anos (não é recomendado para doentes com menos de 18 anos).

2. ANTES DE TOMAR Lercanidipina Jaba

Não tome Lercanidipina Jaba

- se tem alergia (hipersensibilidade) ao cloridrato de lercanidipina ou a qualquer outro componente de Lercanidipina Jaba;
- se alguma vez teve qualquer reacção alérgica a medicamentos semelhantes a Lercanidipina Jaba (tais como os que contêm amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina ou lacidipina);
- se sofrer de determinadas doenças cardíacas:
 - insuficiência cardíaca não tratada;
 - obstrução do fluxo de sangue a partir do coração;
 - angina instável (angina em repouso ou progressivamente crescente);
- se tiver tido um ataque cardíaco no último mês;
- se sofrer de doença grave do fígado ou dos rins;
- se estiver a tomar medicamentos inibidores da isoenzima CYP3A4:
 - medicamentos antifúngicos (como os que contêm cetoconazol ou itraconazol);
 - antibióticos macrólidos (como os que contêm eritromicina ou troleandomicina);

- antivirais (como os que contêm ritonavir);
- se estiver a tomar medicamentos que contenham a substância ciclosporina (usada após transplantes para prevenir a rejeição do órgão transplantado);
- com toranja ou sumo de toranja.
- se estiver grávida ou a amamentar (ver a secção Gravidez e aleitamento para mais informação)

Tome especial cuidado com Lercanidipina Jaba

- Se tiver outros problemas do coração ou se tiver pacemaker ou se tiver angina pre-existente.
- Se tiver problemas com o seu fígado ou com os seus rins ou se fizer diálise.

Ao tomar Lercanidipina Jaba com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica, nomeadamente:

- Medicamentos bloqueadores beta (p. ex. metoprolol), diuréticos (medicamentos usados para aumentar a produção de urina) ou inibidores da ECA (medicamentos usados para tratamento da tensão arterial elevada);
- medicamentos cuja substância activa é cimetidina (mais de 800 mg, usados para úlceras, indigestão ou azia);
- medicamentos cuja substância activa é digoxina (para tratamento de problemas do coração);
- medicamentos cuja substância activa é midazolam (medicamentos que o ajudam a dormir);
- medicamentos cuja substância activa é rifampicina (para tratamento da tuberculose);
- medicamentos cuja substância activa é astemizole ou terfenadina (usados nas alergias);
- medicamentos cuja substância activa é amiodarona ou quinidina (para tratamento de batimentos rápidos do coração);
- medicamentos cuja substância activa é fenitoína ou carbamazepina (para a epilepsia). O seu médico irá fazer um controlo da sua tensão arterial mais frequentemente que o habitual.

Ao tomar Lercanidipina Jaba com alimentos e bebidas

Não deve consumir álcool durante o tratamento com Lercanidipina Jaba uma vez que pode aumentar o efeito deste medicamento.

Não deve comer toranjas nem beber sumo de toranja.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Não tome Lercanidipina Jaba se estiver grávida ou a amamentar, se desejar engravidar ou se não usar qualquer método contraceptivo.

Se está a tomar Lercanidipina Jaba e pensa que pode estar grávida, consulte o seu médico.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Tenha em atenção a possibilidade de sentir tonturas, fraqueza e fadiga. Não conduza veículos ou utilize máquinas até conhecer os efeitos provocados em si por Lercanidipina Jaba.

Informações importantes sobre alguns componentes de Lercanidipina Jaba

Lercanidipina Jaba contém lactose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

3. COMO TOMAR Lercanidipina Jaba

Tome Lercanidipina Jaba sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Adultos: A dose habitual é um comprimido de Lercanidipina Jaba 10 mg por dia, sempre à mesma hora, de preferência de manhã e pelo menos 15 minutos antes do pequeno-almoço, dado que uma refeição rica em gorduras aumenta significativamente os níveis sanguíneos do fármaco. Se necessário, o seu médico poderá aumentar-lhe a dose para um comprimido de Lercanidipina Jaba 20 mg por dia.

De preferência, os comprimidos devem ser engolidos inteiros com um pouco de água.

Idosos: Não é necessário um ajustamento da dose diária. Contudo, deve haver um acompanhamento mais cuidado na fase inicial do tratamento.

Doentes com problemas no fígado ou nos rins devem ter um acompanhamento mais cuidado na fase inicial do tratamento. Nestes doentes, um aumento da dose diária para 20 mg deve ser abordado com cautela.

Crianças: Este medicamento não deve ser tomado por doentes com menos de 18 anos.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico.

Se tomar mais Lercanidipina Jaba do que deveria

Não exceda a dose estabelecida pelo seu médico.

Se tomar mais Lercanidipina Jaba do que deveria ou no caso de sobredosagem, procure imediatamente aconselhamento médico e, se possível, leve os seus comprimidos e respectiva embalagem consigo.

Exceder a dose correcta pode causar uma diminuição excessiva da tensão arterial e os batimentos cardíacos podem tornar-se irregulares ou mais rápidos. Pode ainda provocar inconsciência.

Caso se tenha esquecido de tomar Lercanidipina Jaba

Simplesmente continue, no dia seguinte, como estabelecido.

Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Lercanidipina Jaba

Se parar de tomar Lercanidipina Jaba, a sua tensão arterial pode aumentar novamente. Por favor, consulte o seu médico antes de parar o tratamento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Lercanidipina Jaba pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Efeitos secundários graves (se tiver algum destes efeitos secundários, comunique-o imediatamente ao seu médico):

Raros (afectam menos do que 1 em 1000 doentes): angina de peito (dor no peito ou sensação de pressão devida a um fornecimento insuficiente de sangue ao coração).

Muito raros (afectam menos do que 1 em 10 000 doentes): dor no peito, queda excessiva da tensão arterial, desmaio, reacções alérgicas (os sintomas incluem comichão, rash, urticária).

Se sofre de angina de peito pré-existente, com o grupo de medicamentos ao qual Lercanidipina Jaba pertence, pode ter uma frequência, duração ou gravidade aumentada desses episódios. Podem ocorrer casos isolados de ataque cardíaco.

Outros efeitos secundários possíveis (se algum destes efeitos secundários se agravar, informe o seu médico ou farmacêutico):

Pouco frequentes (afectam menos do que 1 em 100 doentes): dor de cabeça; tonturas; aumento da rapidez dos batimentos cardíacos; palpitações (sentir os batimentos do seu próprio coração, rápidos ou de forma irregular); súbito rubor (a pele torna-se vermelha) na face, no pescoço e no peito; inchaço dos tornozelos.

Raros (afectam menos do que 1 em 1000 doentes): sonolência; má-disposição; vômitos; azia; dor de estômago; diarreia; erupção cutânea (rash); dor muscular; poliúria (grandes quantidades de urina); fadiga.

Muito raros (afectam menos do que 1 em 10 000 doentes): inchaço das gengivas; alterações no funcionamento do fígado (detectado por testes sanguíneos); aumento do número de vezes que urina.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Lercanidipina Jaba

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Lercanidipina Jaba após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e blister. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Conserve na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade. A embalagem de origem deve ser armazenada em local seco.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Lercanidipina Jaba

-A substância activa é cloridrato de lercanidipina

Lercanidipina Jaba 10 mg: cada comprimido contém 10 mg de cloridrato de lercanidipina, equivalente a 9,4 mg de lercanidipina.

Lercanidipina Jaba 20 mg: cada comprimido contém 20 mg de cloridrato de lercanidipina, equivalente a 18,8 mg de lercanidipina.

-Os outros componentes são: lactose mono-hidratada, celulose microcristalina, carboximetilamido sódico, povidona K30, estearato de magnésio, hipromelose, talco, dióxido de titânio (E171), macrogol 6000, óxido de ferro (E172).

Qual o aspecto de Lercanidipina Jaba e conteúdo da embalagem

Lercanidipina Jaba 10 mg:

Comprimidos revestidos por película biconvexos, circulares, amarelos e ranhurados numa das faces.

A ranhura do comprimido destina-se unicamente a facilitar a sua divisão, de modo a ajudar a deglutição, e não a divisão em doses iguais.

Cada embalagem contém 14 ou 56 comprimidos.

Lercanidipina Jaba 20 mg:

APROVADO EM 31-01-2009 INFARMED

Comprimidos revestidos por película biconvexos, circulares, cor-de-rosa e ranhurados numa das faces.

Cada embalagem contém 28 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Jaba Recordati, S. A.
Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo Portugal

Fabricante

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Matteo Civitali, 1
20148 Milan
ITÁLIA
Telefone: +39 0248787431
Fax: +39 0248787277

Este folheto foi aprovado pela última vez em