

MICROLAX AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA É UM ALÍVIO



INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO NOME DO MEDICAMENTO: Microlax, 450 mg/5 ml + 45 mg/5 ml, Solução rectal e Microlax, 270 mg/3 ml + 27 mg/3 ml, Solução rectal
COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Composição por microlax: Citrato de sódio: 450 mg ou 270 mg; Laurilsulfoacetato de sódio 45 mg ou 27 mg. Excipiente q.b.p.: 5 ml ou 3 ml. **FORMA FARMACÉUTICA:** Solução rectal (enema). A solução é viscosa, incolor e contém pequenas bolhas de ar incorporadas. **INFORMAÇÕES CLÍNICAS – Indicações terapêuticas:** Tratamento sintomático da obstipação rectal ou recto-sigmoideia; Encopresis; Obstipação durante a gravidez, obstipação associada ao parto e cirurgia (uso pré e pós-operatório); Preparação do recto e sigmóide para exames endoscópicos. **Posologia e modo de administração:** Adultos e crianças de idade superior a 3 anos: Administrar o conteúdo de uma bisnaga por dia. Na obstipação marcada pode vir a ser necessária a aplicação do conteúdo de duas bisnagas. Crianças até 3 anos: Na maioria dos casos é suficiente uma bisnaga de Microlax a 270 mg/3 ml + 27 mg/3 ml. Modo e via de administração: 1. Retirar a tampa da cânula (Microlax a 270 mg/3 ml + 27 mg/3 ml) ou quebrar o selo da cânula (Microlax a 450 mg/5 ml + 45 mg/5 ml). 2. Comprimir ligeiramente a bisnaga até aparecer uma gota na extremidade da cânula. 3. Introduzir a cânula no recto. 4. Comprimir completamente a bisnaga. 5. Retirar a cânula, mantendo a bisnaga comprimida. **Contra-indicações:** Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer dos excipientes. **Advertências e precauções especiais de utilização:** Recomenda-se evitar a utilização de Microlax no caso de pressão hemorroidária, fissuras anais ou rectais e colites hemorrágicas. **Interações medicamentosas e outras formas de interacção:** Não foram realizados estudos de interacção. **Efeitos indesejáveis:** Doenças gastrointestinais; Frequência desconhecida (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis); Como em relação a todos os medicamentos do género, um uso prolongado pode originar sensação de ardor na região anal e excepcionalmente recites congestivas. **DATA DA REVISÃO DO TEXTO:** Janeiro de 2009. Para mais informações deverá contactar o titular de Autorização de Introdução no Mercado. Medicamento não Sujeito a Receta Médica.

Ref.: 1062014

 **JABA RECORDATI**
GROUP

Lagoas Park, Edf.5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo, Portugal
Tel.: 21 432 95 00 | Fax: 21 915 19 30
www.jaba-recordati.pt

 **EXCELÊNCIA
NO TRABALHO 2013**
HISTÓRIA DE SUCESSO E
ECONOMIA

Capital Social de 2.000.000,00 Euros • Contribuinte nº 500492867 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número.